


Proposition de composition



Emprise par rang

2-3 mètres

(En fonction de la taille latérale pratiquée)

Plantation

Entretien


Subsides

Espèces	Insectes auxiliaires attirés										Capacité d'accueil	Exigence stricte ¹
	Acarions prédateurs (Phytoséiides)	Araignées prédatrices	Carabes	Chrysopes et hémiptères	Coccinelles	Micro-guêpes parasitoïdes	Mouches (Syrphes)	Punaises prédatrices (Anthoricides)	Punaises prédatrices (Mirides)	Thrips prédateurs		
Aulne glutineux	•	•	•	•	•		•	•		•		Hu
Chêne pédonculé	•	•				•		•				
Merisier ^{sp}	•			•	•		•					
Tilleul petites feuilles ^{sp}	•	•		•	•	•		•	•			
Aubépines ^{sp}				•		•	•					
Sureau noir ^{sp}	•	•		•	•	•	•					
Érable champêtre ^{sp}	•	•	•		•	•		•	•			Ca (à neutre)
Saule blanc ^{sp}				•	•			•				Hu
Cornouiller mâle ^{sp}	•											Ca
Cornouiller sanguin ^{sp}	•			•	•	•			•			Ca
Nerprun purgatif							•	•				Ca
Viorne lantane ^{sp}	•	•				•						Ca
Charme	•	•		•	•	•		•	•			
Orme champêtre				•	•	•		•	•			
Noisetier ^{sp}	•			•	•	•	•	•	•			
Lierre grimpant ^{sp}	•			•			•					

Il s'agit ici d'une situation de grandes cultures. En maraîchage et en arboriculture, il est possible de retrouver d'autres auxiliaires et ravageurs. (Plus d'infos [ici](#))

1. **Ca**: besoin d'un sol calcaire; **Ac**: sol acide; **Hu**: sol humide; **Sec**: sol sec.

INTÉRÊTS



VARIANTES

- Double rang, triple rang, ...
- Lierre grimpant au pied des saules et charmes

ESPÈCES POUR UNE HAIE BASSE (MAXIMUM 4M DE HAUTEUR)

Cornouiller mâle/sanguin, viorne lantane

Objectifs