


Proposition de composition



Emprise par rang

2-3 mètres

(En fonction de la taille latérale pratiquée)

Plantation

Entretien

Subsides

| Espèces | Période de fructification | | | | | | | | | | | | Exigence stricte ¹ | Abri ² | |
|--|---------------------------|-----|------|-------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------|-------------------|-------------|
| | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | | | |
| Merisier ^{sp} | | | | | | • | • | | | | | | | | |
| Cerisier à grappes ^{sp} | | | | | | • | • | • | | | | | | | |
| Groseillier à maquereaux ^{sp} | | | | | | • | • | • | | | | | | | |
| Framboisier ^{sp} | | | | | | • | • | • | • | • | | | | | |
| Cornouiller mâle ^{sp} | | | | | | | • | • | • | | | | | | Ca |
| Sureau noir ^{sp} | | | | | | | • | • | • | | | | | | |
| Bourdaine ^{sp} | | | | | | | • | • | • | • | | | | | |
| Poirier/pommier sauvage ^{sp} | | | | | | | | • | • | • | | | | | |
| Sorbier des oiseleurs ^{sp} | | | | | | | | • | • | | | | | | |
| Alisier blanc ^{sp} | | | | | | | | | • | • | | | | | Ca ou Ac, S |
| Alisier torminal ^{sp} | | | | | | | | | • | • | | | | | |
| Aubépines ^{sp} | | | | | | | | | • | • | | | | | E |
| Chêne pédonculé/sessile | | | | | | | | | • | • | | | | | M |
| Eglantier ^{sp} | • | | | | | | | | • | • | • | • | | | E |
| Troène commun ^{sp} | • | | | | | | | | • | • | • | • | | | Ca, S |
| Néflier ^{sp} | | | | | | | | | | • | • | • | | | Ac |
| Prunelier ^{sp} | | | | | | | | | | • | • | • | | | E |
| Houx ^{sp} | • | • | | | | | | | | • | • | • | | | P |
| Viome obier ^{sp} | • | • | | | | | | • | • | • | • | • | | | |
| Ronces ^{sp} | | | | | | | | • | • | • | | | | | E |
| Lierre grim pant ^{sp} | • | • | • | • | • | | | | | | | | • | | P |

• En gras, les espèces fournissant une excellente nourriture pour les frugivores.
 • Vigilance avec le cerisier à grappes qui est également l'hôte du puceron des céréales.

1. **Ca**: besoin d'un sol calcaire; **Ac**: sol acide; **Hu**: sol humide; **Sec**: sol sec.
 2. E= épineux; P = persistant (feuillage vert toute l'année); SP = semi-persistant (les feuilles tombent en partie); M = marcescent (les feuilles flétrissent mais ne tombent pas).


VARIANTES

- Double rang, triple rang, ...
- Lierre grim pant et ronces au pied des aubépines
- En prairie pâturée : remplacer les groseilliers et framboisiers par d'autres arbustes pour renforcer l'effet clôture

ESPÈCES POUR UNE HAIE BASSE (MAXIMUM 4M DE HAUTEUR)

Bourdaine, cornouiller mâle, églantier, framboisier, groseillier à maquereaux, prunelier, troène commun, viome obier

INTÉRÊTS



Objectifs