


Proposition de composition



Emprise par rang

2-3 mètres

(En fonction de la taille latérale pratiquée)

Plantation

Entretien

Subsides

Espèces	Période de fructification												Exigence stricte ¹	Abri ²	
	Jan	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Août	Sep	Oct	Nov	Déc			
Merisier ^{sp}						•	•								
Cerisier à grappes ^{sp}						•	•	•							
Groseillier à maquereaux ^{sp}						•	•	•							
Framboisier ^{sp}						•	•	•	•	•					
Cornouiller mâle ^{sp}							•	•	•						Ca
Sureau noir ^{sp}							•	•	•						
Bourdaine ^{sp}							•	•	•	•					
Poirier/pommier sauvage ^{sp}								•	•	•					
Sorbier des oiseleurs ^{sp}								•	•						
Alisier blanc ^{sp}									•	•					Ca ou Ac, S
Alisier torminal ^{sp}									•	•					
Aubépines ^{sp}									•	•					E
Chêne pédonculé/sessile									•	•					M
Eglantier ^{sp}	•								•	•	•	•			E
Troène commun ^{sp}	•								•	•	•	•			Ca, S SP
Néflier ^{sp}										•	•	•			Ac
Prunelier ^{sp}										•	•	•			E
Houx ^{sp}	•	•								•	•	•			P
Viome obier ^{sp}	•	•						•	•	•	•	•			
Ronces ^{sp}							•	•	•						E
Lierre grim pant ^{sp}	•	•	•	•	•								•		P

• En gras, les espèces fournissant une excellente nourriture pour les frugivores.
 • Vigilance avec le cerisier à grappes qui est également l'hôte du puceron des céréales.

1. **Ca**: besoin d'un sol calcaire; **Ac**: sol acide; **Hu**: sol humide; **Sec**: sol sec.
 2. E= épineux; P = persistant (feuillage vert toute l'année); SP = semi-persistant (les feuilles tombent en partie); M = marcescent (les feuilles flétrissent mais ne tombent pas).


VARIANTES

- Double rang, triple rang, ...
- Lierre grim pant et ronces au pied des aubépines
- En prairie pâturée : remplacer les groseilliers et framboisiers par d'autres arbustes pour renforcer l'effet clôture

ESPÈCES POUR UNE HAIE BASSE (MAXIMUM 4M DE HAUTEUR)

Bourdaine, cornouiller mâle, églantier, framboisier, groseillier à maquereaux, prunelier, troène commun, viome obier

INTÉRÊTS



Objectifs