


Proposition de composition



Emprise par rang

2-3 mètres

(En fonction de la taille latérale pratiquée)

Plantation

Entretien

Subsides

Espèces	Période de fructification												Exigence stricte <sup>1</sup>	Abri <sup>2</sup>	
	Jan	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Août	Sep	Oct	Nov	Déc			
Merisier <sup>sp</sup>						•	•								
Groseille à maquereaux <sup>sp</sup>						•	•	•							
Framboisier <sup>sp</sup>						•	•	•	•	•					
Sureau noir <sup>sp</sup>							•	•	•						
Bourdaine <sup>sp</sup>							•	•	•	•					
Pommier/poirier sauvage <sup>sp</sup>								•	•	•					
Sorbier des oiseleurs <sup>sp</sup>								•	•						
Alisier torminal <sup>sp</sup>									•	•					
Aubépines <sup>sp</sup>									•	•					E
Chêne pédonculé/sessile									•	•					M
Eglantier <sup>sp</sup>	•								•	•	•	•			E
Néflier <sup>sp</sup>										•	•	•			Ac
Prunelier <sup>sp</sup>										•	•	•			E
Houx <sup>sp</sup>	•	•								•	•	•			P
Viorne obier <sup>sp</sup>	•	•						•	•	•	•	•			
Ronces <sup>sp</sup>							•	•	•						E
Lierre grim pant <sup>sp</sup>	•	•	•	•	•								•		P

• En gras, les espèces fournissant une excellente nourriture pour les frugivores.  
• Vigilance avec le cerisier à grappes qui est également l'hôte du puceron des céréales.

1. **Ca**: besoin d'un sol calcaire; **Ac**: sol acide; **Hu**: sol humide; **Sec**: sol sec.  
2. E= épineux ; P = persistant (feuillage vert toute l'année) ; SP = semi-persistant (les feuilles tombent en partie) ; M = marcescent (les feuilles flétrissent mais ne tombent pas).

VARIANTES

- Double rang, triple rang, ...
- Lierre grim pant et ronces au pied des aubépines
- En prairie pâturée : remplacer les groseilliers et framboisiers par d'autres arbustes pour renforcer l'effet clôture

ESPÈCES POUR UNE HAIE BASSE (MAXIMUM 4M DE HAUTEUR)

Bourdaine, églantier, framboisier, groseillier à maquereaux, prunelier, viorne obier

Objectifs

INTÉRÊTS

