


Proposition de composition



Emprise par rang

2-3 mètres

(En fonction de la taille latérale pratiquée)

Plantation


Entretien

Subsides

Espèces	Période de floraison												Potentiel (/5)		Exigence stricte ¹
	Jan	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Août	Sep	Oct	Nov	Déc	Pollen	Nectar	
Noisetier ^{sp}		•	•										4	4	
Saule marsault ^{sp}		•	•	•									4	4	
Prunelier ^{sp}			•	•									4	4	
Cassissier ^{sp}				•	•								4	4	
Érable sycomore ^{sp}				•	•								4	4	
Groseiller rouge ^{sp}				•	•								4	4	
Merisier ^{sp}				•	•								4	4	
Poirier/pommier sauvage ^{sp}				•	•								4	4	
Aubépine à 1 style ^{sp}					•	•							4	4	
Bourdaie ^{sp}					•	•	•						4	4	
Eglantier ^{sp}					•	•	•						4	4	
Framboisier ^{sp}					•	•	•	•					4	4	
Châtaignier ^{sp}						•	•						4	4	
Tilleul grandes feuilles ^{sp}						•	•						4	4	Sec
Tilleul petites feuilles ^{sp}						•	•						4	4	Sec
Lierre grimpant ^{sp}									•	•			4	4	
Ronces ^{sp}					•	•	•	•					4	4	

1. Ca: besoin d'un sol calcaire; Ac: sol acide; Hu: sol humide; Sec: sol sec.

INTÉRÊTS



VARIANTES

- Double rang, triple rang, ...
- Lierre grimpant et ronces au pied des aubépines et saules marsaults
- En prairie pâturée : remplacer les cassissiers, groseilliers et framboisiers par d'autres arbustes pour renforcer l'effet clôture

ESPÈCES POUR UNE HAIE BASSE (MAXIMUM 4M DE HAUTEUR)

Bourdaie, cassissier, églantier, framboisier, groseillier rouge, prunelier

